

تقنيات أخذ عينات التربة للتحليل

إختيار العينات



قم بتسجيل إحداثيات
الموقع لمتابعة
خصوبة التربة مستقبلاً



تأكد من جمع العينات من المناطق الأكثر تجانساً
نفس الزراعة السابقة، نفس التضاريس، نفس نوع
التربة من حيث اللون، النوع العمق، والرطوبة،



الابتعاد عن حواف الحقول
موقع أخذ العينات يكتسي أهمية كبرى
لمتابعة خصوبة التربة مستقبلاً



تجنب جمع العينات من ضفاف
الأودية، الطرقات
المسالك الفلاحية ومناطق التخزين

عمق العينات



الأشجار المثمرة: 30-0 صم
(بالنسبة لمتابعة الخصوبة)
إلى 120 صم



المراعي: 15-0 صم



الزراعات الكبرى: 15-0 صم

عينة واحدة 1 كغ

اخلط العينات جيداً
للحصول على عينة واحدة
تزن 0.5 إلى 1 كغ ممثلة
للقطعة



+



عينة 25 < 15

أخذ من 15 إلى 25 عينة في كل منطقة
متجانسة حسب إحدى الطرق الثلاث التالية

توقيت أخذ العينات



أفضل وقت لأخذ العينات
هو بعد الحصاد أو قبل بدء
الممارسات الزراعية للموسم الجديد



تجنب أخذ العينات عندما
تكون التربة شديدة الرطوبة



لا تأخذ العينات مباشرة بعد التسميد، بل
قبل الزراعة: في الخريف للمحاصيل
الشتوية، وفي الربيع للمحاصيل الصيفية



يمكن أخذ العينات طوال العام ومن
المستحسن بعد 1-3 أشهر من إضافة
الأسمدة المعدنية و 6 أشهر بعد
استخدام الأسمدة العضوية

قبل أخذ العينة، يجب إزالة المخلفات النباتية، القش، والنباتات المزروعة أو الطبيعية من الموقع. كما يجب تنقية العينة من جذور
النباتات. إذا كانت هناك أملاح متجمعة على سطح التربة، يجب قشط الطبقة السطحية